

診 断 書

住 所 [REDACTED]

氏 名 [REDACTED]

大(昭)平・令 [REDACTED]

病 名 運動障害

現症 上記疾患の為 不安感 抑う感

朝や夜起きておられ。

上記の通り診断します

令和 2 年 // 月 // 日

京都府福知山市篠尾新町1丁目56番地の1
医療法人 風会 いづみメンタルクリニック
大 八 木 和 泉
TEL&FAX 0773-23-8841



殿

令和2年11月2日

内用薬

メラックス(1mg) 1錠/日(朝食後 1/2錠
夕食後 1/2錠)

ドクマキール(50mg) 1錠(朝食後)

おだいじに

14日分



けんこうかい
医療法人 頤風会

いづみメンタルクリニック
診療科／心療内科 精神科

〒620-0055 京都府福知山市篠尾新町1丁目56番地1

TEL 0773-23-8341

診療時間	月	火	水	木	金	土
AM10:00~12:00	○	○	○	○	○	×
PM 5:00~ 6:00	○	○	×	○	○	×

休診日／土・日・祝日

診断書

京都府 福知山市 土師新町四丁目 ■■■
住 所 ■■■ (土師新町東)

氏 名 ■■■ 様

1 病名 片頭痛、不眠症

上記疾患にて、当面は安静と療養を要します。

上記のとおり診断します。

令和 1 年 05 月 08 日

福知山市厚中町 231 番地

市立福知山市民病院

医師 ■■■



「診断書」

病名 片頭痛、不眠症

上記疾患にて、当面は安静と療養を要します。

①4月 26 日に処方した頭痛薬の効果がなく、これ以上対処できない。

②他の病気になる前に早く対応しないといけない。

※アレルギーが出る心配がある。(特に子供の方が大人より敏感なので心配)

※突然倒れる

※不眠症

※うつ病(精神的にやられたら手遅れになる)

③音(騒音)はジャブのように長い時間をかけてきいてくる

④公害、環境問題で間違いない(騒音公害、臭気公害)

⑤におい、気持ち悪いに理由はいらない(個人差問題)

※自分がたえられないものは、1回嫌になるとおらない。

※因果関係が証明できないから法的に難しい。

※環境問題などは診断書には書けない事を、相手側はわかっているから必ず因果関係をついてくる。

※個人の診断書を集めて集団訴訟にするや、会社に対して立ち退きを要求するなどするべきだが、裁判になれば何十年かかる、その間我慢している間に倒れて死ぬかもしれない、そんな事をしてまで勝ちたいか?と言われ悲しくなるが、厳しいがそれが今の日本の法律の現実だと知る。

⑥薬で効くとかごまかしても必ず他の病気が誘発される。

※薬も効果がなく、頭痛も限界にきてるのがわかるから、他の病気になってしま前にも早く避難するべき(引っ越しがベスト)

※子供にも環境が良くないしかわいそう。早く引っ越ししなさい。

处方箋

（株）新日本製薬・第一製薬販賣公司

13.04.1021	保薦者番号	1312601017
13.05.31.10	被保薦者名 上級医師名 下級医師名	新日本製薬・第一製薬販賣公司 新日本製薬・第一製薬販賣公司 新日本製薬・第一製薬販賣公司
新日本製薬・第一製 業販賣公司	電話番号	0773-821-1111
新日本製薬・第一製 業販賣公司	保薦函氏名	
2019年07月05日	处方箋的 使用期間	2019年07月05日
0%		

被保薦者番号	已有	新日本製薬・第一製 業販賣公司	新日本製 業販賣公司
新日本製 業販賣公司	新日本製 業販賣公司	新日本製 業販賣公司	新日本製 業販賣公司

【甲】七十岁左右，止痛剂200mg
★★疼痛時
1回1錠
1日3次

以下空白

2019.7.4 前月 10:40 痛到此为止。痛點片頭痛，
後半部更以側頭部化 18:47 (藥效18:47)

③ 痛點片頭部片頭痛。市立醫院投急室2週前止。

(次回) 次回(初回) 痛到止為止。

2019.6.25~9月10日止
統一2週期止
例回一週期止

新到(新)
統一2週期止
統一2週期止
統一2週期止
(新)
(新)

2019.7.6 痛點片頭部片頭痛。(新)
(新)
(新)

§処方薬について§

平成31年04月26日 受付No : fax

医療機関 : 市立福知山市民病院


氏名 : [REDACTED]

I D : [REDACTED] 性別 : 女

生年月日 : [REDACTED]

診療科 : 内科

処方医 : [REDACTED]



お薬名 ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「J.G」(処方名:ゾルミトリプタ
ン口腔内崩壊錠2.5mg)
用法 <頓服> 頭痛時服用
1回1錠 5回分 1日4回まで
2週間以上あけて

残
薬

(計5錠)

- ・片頭痛の治療薬です。
- ・脳血管や三叉神経に作用して異常に拡張した血管を収縮させる作用があります。
- ・医師の指示を守って服用してください。眠気、吐き気などがおこることがあります。
- ・車の運転や高所作業など危険を伴う作業は避けてください。

《後発品情報》この薬は後発医薬品です。

*お薬の飲み合わせについての注意

・他のお薬を使っている場合、今回のお薬と一緒に使用することで効能や副作用に影響を与えるお薬があります。他に使っているお薬は医師・薬剤師にお知らせください。

※お薬の相互作用は必ず起こるものではありません。念のためご注意ください。

- ◆ 患者さまご自身が服用（使用）する大切なお薬です。お薬の内容と説明文をご確認の上、不明な点については、当薬局までご連絡下さいますようお願い致します。
- ◆ お薬を服用または使用した後で、何か変だと感じたら、すぐに主治医または薬剤師にご連絡ください。
- ◆ 他の医療機関（病院や医院、歯科医院など）を受診する際には、この説明文をご提示ください。
- ◆ お薬の写真は印刷ですので、実際のものとは若干色合いが異なる場合があります。
- ◆ ご使用中のお薬について厚生労働省から新しい副作用情報などが入りましたら、ご希望の方に速やかにご連絡致します。
- ◆ 各々のお薬の1回服用量を表示しています。複数のお薬を混合した液剤など、薬袋に示された服用量と異なる場合があります。
- ◆ 《後発品情報》には、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の有無と単位あたりの薬価、当薬品の取扱い状況を記載しています。
- ◆ 当薬局では、ご自宅などで在宅療養されている患者さまの訪問薬剤管理指導も承ります。詳細は薬剤師にご相談ください。
- ◆ ご使用中のお薬でご自宅に残っているお薬はございませんか？残ったお薬名に○をつけ「残薬」欄にお薬の数を記入し、主治医または薬剤師にお渡しください。
- ◆ なお、ここでいう後発医薬品には、基礎的医薬品を含みます。

日本調剤 福知山薬局

【電話】0773-25-4068 【薬剤師】

【FAX】0773-25-4073

【緊急連絡先】080-1271-1370

氏名：[REDACTED] 様

I D : [REDACTED]

性別：女性

生年月日：[REDACTED]

平成31年04月26日 受付No : fax

処方医療機関：市立福知山市民病院

診療科：内科

処方医：[REDACTED] 先生

●以下は、今回の処方にに関する後発医薬品（ジェネリック医薬品）の有無と、当薬局でのお取り扱い状況です。

実際に今回お渡しした薬については、別紙「処方薬について」をご覧ください。

●なお、ここでいう後発医薬品は基礎的医薬品の扱いとなっているものを含みます。

* ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「JG」

区分	写真	剤形	特性	商品名	一般名	製造会社	規格単位	薬価	-	処方量	薬剤料合計	処方薬との 薬剤料の差	処方薬との 同等性
先発	[REDACTED]	錠	口腔	ゾーミッグRM錠2.5mg	ゾルミトリプタン 口腔内崩壊錠2.5mg	アストラ ゼネカ	2.5 mg	730.3円	-	5錠	3,652円	-	-
後発	[REDACTED]	錠	口腔	ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「JG」	ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「JG」	日本ジェ ネリック	2.5 mg	294.1円	-	5錠	1,471円	2,181円	○

※患者様負担差額はあくまで参考値です。実際の差額と異なる場合があります。詳しい差額等については、薬剤師までお尋ねください。

■今回処方分 ※すべての後発品をご利用された場合

処方薬薬剤料合計	後発品薬剤料合計	薬剤料差額	患者様 負担差額 (3割負担)
3,652円	1,471円	2,181円	654円

薬局名 日本調剤 福知山薬局
 所在地 〒620-0055 京都府福知山市篠尾新町3丁目116番-1
 電話番号 0773-25-4068

2019/04/26 12:25:54

様

のお薬の説明書です。(3種類)

2020/02/28

●服用または使用する前に必ずお読み下さい。

ページ: 1/2

No	色・形・記号	名前・効能・効果	用法・用量					注意事項
	白・素錠 KW 377	チザニジン錠 1mg 「アメル」 【般】チザニジン錠 1mg 【科目なし】 筋肉のこわばりを和らげる 後発医薬品です	起 床	朝	昼	夕	寝	◆ 組合せのできない薬や、組合せに注意が必要な薬があります。他の医療機関で診察を受けたり、薬局で薬を購入する際には、この文書を見せて下さい。タバコ(喫煙)、市販胃腸薬、アルコール含有品にも、注意が必要です。 ◆ 発疹・かゆみ等の過敏症状が現れた時は、お薬の中止を要する場合もありますので、医師または薬剤師にご相談下さい。薬の作用により、眠気をもよおすことがあります。 ◆ 眠気、めまい等が現れることがありますので、車の運転や危険を伴う作業は控えて下さい。また、薬の作用に影響を及ぼすがあるので、飲酒や喫煙は控えるようにして下さい。 ◆ 妊婦または妊娠の可能性のある方は、ご相談下さい。また、授乳中の場合は、母乳による授乳を控えて下さい。
2	極薄紅・素錠 103:KSK	ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg 1錠 【般】ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg 1錠 【科目なし】 痛みや炎症を抑える薬 熱を下げる薬 後発医薬品です	起 床	朝	昼	夕	寝	◆ 組合せに注意が必要な薬があります。他の医療機関で診察を受けたり、薬局で薬を購入する際には、この文書を見せて下さい。 ◆ 発疹・かゆみ等の過敏症状が現れた時は、お薬の中止を要する場合もありますので、医師または薬剤師にご相談下さい。 ◆ 妊婦または妊娠している可能性のある方は、お申し出下さい。また、授乳中の場合は、母乳による授乳を控えて下さい。
3	青緑/淡橙・Cap テブレノン	テブレノンカプセル 50mg 1カプセル 【般】テブレノンカプセル 50mg 【科目なし】 胃の粘膜を保護する薬 後発医薬品です	起 床	朝	昼	夕	寝	◆ 発疹・かゆみ等の過敏症状が現れた時は、お薬の中止を要する場合もありますので、医師または薬剤師にご相談下さい。 ◆ 妊婦または妊娠の可能性のある方は、ご相談下さい。

【薬局からのお知らせ】

- ◆ ご不明なことありましたらお問い合わせください。
- ◆ お薬が上記の写真と異なる場合がありますが、ご了承ください。
- ◆ 他の病院にかかる時は、この表を提示してください。
- ◆ 当薬局では、在宅患者訪問薬剤管理指導を行うことが認められた薬局です。
- ◆ 営業時間外の問い合わせ先 : 080-4960-8460